

FICHE TECHNIQUE

KOL-RAT BLOC

Page 1 de 2

Composition

Brodifacoum 0.005 %
Excipients CSP 100 %

Formulation Appât Bloc de 20 g prêt à l'emploi

Description KOL-RAT est le raticide anticoagulants efficace pour l'élimination des rongeurs domestique tels que rats noires, souris et surmulots dans tous les lieux infestés, pour une protection de la santé publique, les produits et les matériels stockés.

Organismes Ciblés Produit autorisé exclusivement pour le contrôle des rats (*Rattus Norvegicus* et *Rattus rattus*), Souris (*Mus musculus*).

Catégorie d'usage usage professionnel autorisés

Doses d'emploi et fréquence d'application

Souris : Jusqu'à 40 g de KOL-RAT par poste espacés de 10 m
Rats : Jusqu'à 100 g de KOL-RAT par poste espacés de 10 m

Mode d'emploi : Vérifier l'efficacité de produit sur site, en cas de échéant, les causes de diminution de l'efficacité doivent être recherchées afin de s'assurer l'absence de résistance.
Ne pas utiliser le produit dans les zones ou des cas de résistance sont suspectés ou établis.
Avant tout utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Les sachets ne doivent pas être ouverts. Les Boîtes d'appât ne doivent pas être utilisées pour contenir d'autres produits que des rodenticides. Les appâts doivent être disposés de manière à minimiser les risques pour les espèces non cibles, les enfants et les animaux de compagnie.
Ne pas disposer les appâts sur les surfaces et les ustensiles qui pourraient être en contact avec les aliments afin d'éviter la contamination humaine et animal. Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer pendant l'utilisation de produit. Se laver les mains après application.
Alternar les produits ayant des substances actives, avec les modes d'action différents afin d'éviter l'apparition des phénomènes de résistance. Ne pas nettoyer les boîtes d'appâts entre deux applications.

Précaution d'emploi P102 conserver hors de portées des enfants P103 Avant tout utilisation, lire l'étiquette P230 Porter les gants de protection

Mesures d'atténuation des risques : Les Sachets de raticide doivent être bien étiquetées. C'est obligatoire d'ajouter un colorant peu attractif pour la faune, spécialement les oiseaux, et aussi pour éviter de confondre une substance rodenticide avec un aliment destiné à l'homme ou aux animaux. Cette préparation contient une substance très amère diminuant le risque d'absorption et empoisonnement. Le produit ne doit pas être utilisé comme appât permanent pour prévenir l'apparition de rongeurs. Collecter les rongeurs morts pour éviter l'absorption pour des autres animaux.

Information sur les effets directs et indirects, premier secours, protection de l'environnement :

Retirer la victime de la zone d'exposition, enlever immédiatement tous vêtements souillés ou éclaboussés. **Contact oculaire :** Rincer les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes, en cas



FICHE TECHNIQUE

KOL-RAT BLOC

Page 2 de 2

d'irritation, consulter un médecin. **Contact cutané** : Laver abondamment avec de l'eau et du savon sans frotter, en cas de ingestion, si la quantité est peu importante (pas plus d'une gorgée) rincer la bouche avec de l'eau et consulter un médecin ou un centre antipoison. Garder en repos, ne pas faire vomir sauf avis contraire du centre antipoison ou du docteur. Conserver la température corporelle. Contrôler la respiration, si nécessaire pratiquer la respiration artificielle. Si la personne est inconsciente, placez le sujet en position latérale. Appeler un médecin pour juger de l'opportunité d'une surveillance et d'un traitement ultérieur en milieu hospitalier, si besoin est, montrer l'étiquette. Prendre contact avec le centre antipoison le plus proche. Ne jamais laisser seule une personne en cas d'intoxication.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes cliniques, saignement nasal, saignement des gencives, crachement de sang, apparition d'hématomes multiples ou étendu, apparition généralement brusque d'une douleur viscérale inhabituelle.

Symptômes biologiques, sang dans les urines, augmentation du temps de coagulation.

Traitement primaire est anti dotale plutôt qu'un diagnostic clinique : la vitamine K1 spécifique (phytoménadione).

L'efficacité du traitement est évaluée par la mesure du temps de coagulation. Ne pas interrompre le traitement jusqu'à ce que le temps de coagulation redevienne et DEMEURE normal

Consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Contacter le centre antipoison du Maroc, Téléphone **0801000180** et **0537686464**

Stockage, stabilité et réactivité : conserver dans l'emballage original, dans un lieu frais, sec et bien ventilé. Conserver à l'abri des rayons solaires et la chaleur. Garder loin de les enfants et les animaux de compagnie.

Expiration 5 ans à partir de la date de fabrication

Instructions relatives à l'élimination de produit et son emballage

Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréées.

N° AMM Espagne : **ES/MR-2018-14-00270**

N° AMM Maroc : **RAT-III-35-20**

